

بررسی مخاطرات زیست‌محیطی حشره‌کش‌های پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از

شاخص EIQ

سید جلال یدالهی نوش آبادی^۱، محمد رضا جهانسوز^{۲*}، ناصر مجنون حسینی^۲ و غلامرضا پیکانی^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

یدالهی نوش آبادی، س.ج.، جهانسوز، م.ر.، مجنون حسینی، ن.، و پیکانی، ق.ر. ۱۳۹۶. بررسی مخاطرات زیست‌محیطی حشره‌کش‌های پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از شاخص EIQ. بوم‌شناسی کشاورزی، ۹(۴): ۱۰۳۰-۱۰۲۰.

چکیده

در سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی درباره اثرات آفت‌کش‌ها روی موجودات غیر هدف به‌وجود آمده است. بقایای ناشی از مصرف سموم شیمیایی آفت‌کش سبب آلودگی محیط‌زیست گردیده و سلامتی انسان‌ها را در معرض خطر جدی قرار داده است. محدوده مطالعاتی هشتگرد با وسعتی حدود ۱۱۷۰ کیلومتر مربع بدلیل نزدیکی به کلان‌شهر تهران و تمرکز تعداد زیاد واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی دارای موقعیت سیاسی-اقتصادی مهمی می‌باشد. این مقاله اثرات منفی حشره‌کش‌های عمده مصرف شده در منطقه هشتگرد و میزان ریسک بالقوه و محیطی آن‌ها را با استفاده از شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در میان حشره‌کش‌های عمده مصرفی در منطقه هشتگرد سمیت بالقوه ایمیداکلوپراید (کنفیدور) و تأثیر محیطی مزرعه‌ای مالاتیون بیشتر بوده است. بیشترین خطر در هر سه جزء کارگران مزرعه، مصرف‌کننده و اکولوژیک مربوط به سم ایمیداکلوپراید بود که این سم را به عنوان خطرناک‌ترین حشره‌کش عمده مصرفی در منطقه مطرح کرد. شاخص EIQ برای سموم ایمیداکلوپراید، دیازینون، مالاتیون و فوزالون بیشترین تأثیرپذیری را از بخش اثر اکولوژیک گرفته که به ترتیب ۱۰۵/۷، ۸۱/۷۵، ۶۳/۲۵ و ۵۸/۲۵ بوده است. در خصوص سم دلتامترین قسمت کارگران مزرعه بیشترین تأثیر را بر روی نمره نهایی EIQ داشته است. هم‌چنین نتایج نشان داد که بر اساس شاخص تأثیر زیست‌محیطی، بیشترین مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از سوم حشره‌کش در منطقه هشتگرد به دلیل عدم شناخت مناسب و انتخاب غیرصحيح برخی از حشره‌کش‌ها و استفاده بیش از اندازه آن‌ها می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: آفت‌کش، اثر اکولوژیک، ایمیداکلوپراید، دیازینون

مقدمه

محصولات زراعی و در نتیجه به خطراتان سلامت و بهداشت انسان و دام نمونه‌هایی از اثرات مضر مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد (BayBordi, 2000; Malakouti et al., 2001). مشکلی که همواره در ارتباط با آفت‌کش‌ها وجود دارد، مربوط به مخاطرات متعدد زیست‌محیطی و تهدید سلامت انسان است که در سطوح مختلف چرخه استفاده از آن‌ها از جمله تولید، فروش، استفاده در مزارع و در نهایت، به صورت بقایا در مواد غذایی بروز می‌کند (Holvoet, 2006). آفت‌کش‌ها بر حسب تأثیری که روی سلامت انسان دارند و اثرشان روی محیط با یکدیگر متفاوتند (Jansen et al., 1995).

از جمله شاخص‌های جبری که به منظور برآورد سمیت خطرات

مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی گرچه سبب افزایش عملکرد و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود، ولی به دنبال خود آثار مخربی را به همراه دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. آلوده کردن محیط‌زیست به‌ویژه آب‌های زیرزمینی، تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات در اندام‌های مصرفی

۱، ۲ و ۳ - به ترتیب دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، استاد، گروه زراعت و استادگروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

(* - نویسنده مسئول: Email: jahansuz@ut.ac.ir)

DOI:10.22067/JAG.V9I4.50487

بر روی سموم حشره‌کش مصرفی در محصولات زراعی و باغی منطقه هشتگرد انجام گرفته در گام اول شناسایی پنج حشره‌کشی که بیشترین مصرف را دارند و سپس بررسی اثرات منفی حشره‌کش‌های عمده مصرف شده در منطقه هشتگرد و تعیین میزان خطر بالقوه و بالفعل آن‌ها با استفاده از شاخص EIQ می‌باشد، به طوری که در نهایت بتوان حشره‌کش‌های پرخطر منطقه را شناسایی کرد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

کل کشور از شش حوضه آبریز اصلی و ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ تشکیل شده است. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کل کشور به ۶۰۹ محدوده مطالعاتی مختلف تقسیم شده است. محدوده مطالعاتی هشتگرد یکی از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور و بخش‌هایی از حوضه آبریز درجه ۲ تحت عنوان حوضه آبریز دریاچه نمک را شامل می‌شود (Report of Tehran Regional Water Company, 2013). مساحت ارتفاعات و دشت در این محدوده به ترتیب ۵۷۹ و ۵۹۱/۶ کیلومتر مربع (در مجموع ۱۱۷۰/۶ کیلومتر مربع) و حداکثر و حداقل ارتفاع به ترتیب ۴۰۵۸ و ۱۱۳۳ متر می‌باشد. این محدوده مطالعاتی بخش‌هایی از دو شهرستان ساوجبلاغ (قطب باغی استان البرز) و نظر آباد (قطب زراعت استان) و بیش از ۹۰ درصد زمین‌های کشاورزی این دو شهرستان را شامل می‌شود. در این مطالعه، داده‌های مربوط به این دو شهرستان به عنوان داده‌های محدوده مطالعاتی هشتگرد منظور می‌گردد. از مهمترین بخش‌های موجود در این محدوده مطالعاتی می‌توان به چنار، چهارباغ و تنکمان اشاره نمود (شکل ۱). تعداد کل بهره‌برداران در محدوده مطالعاتی حدود ۱۶۸۰۰ نفر می‌باشد و سهم شاغلان بخش کشاورزی ۷/۶ درصد از کل جمعیت منطقه (۲۲۰ هزار نفر) می‌باشد (Alborz Province Agricultural Organization, 2013). موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی هشتگرد در شکل ۱ نشان داده شده است.

میانگین بارندگی سالانه این منطقه حدود ۲۰۰ الی ۳۴۰ میلی‌متر بوده و بیش از یک میلیون تن در سال محصولات کشاورزی تولید می‌کند. به استناد داده‌های سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در منطقه هشتگرد ۱۸ محصول زراعی مختلف در مساحت ۳۵۸۱۸ هکتار و بیش از ۱۵ نوع محصول باغی در مساحت ۱۶۶۰۰ هکتار کشت می‌شوند.


زیست‌محیطی سموم دفع آفات شیمیایی از آن‌ها استفاده می‌شود، می‌توان شاخص متکالف (Metcalfe, 1982)، شاخص POCER^۱ و شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ)^۲ را نام برد. شاخص متکالف به عنوان اولین شاخص جبری شناخته می‌شود و زیربنای گسترش شاخص‌های جبری دیگر را فراهم ساخته است. شاخص POCER نیز از جمله این شاخص‌ها است که از ۱۰ قسمت از جمله سمیت برای کاربران، کارگران مزرعه و پرندگان تشکیل شده است. برای هر قسمت از این مدل سمیت بین صفر تا یک می‌باشد. نمره حاصله برای هر قسمت می‌تواند به صورت مجزا و یا به صورت مجموع برای بیان سمیت برای انسان و محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد (Vercruyssen & Steurbaut, 2002).

شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) شکل تکامل یافته دو شاخص قبلی بوده و انتخاب آفت‌کش‌ها طبق این شاخص برای محیط‌زیست مطلوب به نظر می‌آید. با استفاده از این شاخص می‌توان سموم دفع آفات شیمیایی را بر اساس مخاطرات زیست‌محیطی و خطرات موجود برای سلامت انسان طبقه‌بندی کرد و سمومی که حداقل مخاطرات را به دنبال دارند، انتخاب نمود (Kovach et al., 1972; Kovach et al., 1992; Deihimfard et al., 2007). از آنجایی که سهولت و سادگی در اندازه‌گیری از مشخصه‌های مناسب شاخص‌های ارزیابی زیست‌محیطی به شمار می‌رود، و شاخص EIQ این مشخصه را دارد در این مطالعه از این شاخص استفاده شد. هم‌چنین محاسبه شاخص EIQ به ما نشان می‌دهد که کدامیک از سه بخش مصرف‌کننده، کارگران مزرعه و اکولوژیست‌ها بیشتر در معرض خطرات استفاده از سموم شیمیایی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در یک پژوهش که بر روی تمامی حشره‌کش‌های ثبت شده در ایران انجام گرفت، نمره نهایی EIQ در درجه اول بیشترین تأثیرپذیری را از قسمت اثرات اکولوژیست (۷۹/۲۰) و در درجه دوم از قسمت کارگران مزرعه (۵۹/۲۶) گرفته است (Moeinodini et al., 2014). در پژوهش‌های دیگر بیشترین اثر منفی کاربرد آفت‌کش‌ها را به ترتیب مربوط به جزء اکولوژیستی، کارگران مزرعه، مصرف‌کنندگان و آبشویی دانسته‌اند (Bues et al., 2004; Soltani et al., 2011).

هدف از این پژوهش که در قالب یک پروژه پیمایشی-تحلیلی

1-Pesticide Occupational and Environmental Risk Indicator

2- Environmental Impact Quotient



شکل ۱- مختصات جغرافیایی محدوده مطالعاتی هشتگرد
 Fig. 1- The geographical coordinates of the Hashtgerd study area

جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به نوع و مقدار سموم مصرفی از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان کلیه محصولات زراعی و باغی موجود در منطقه (تعداد ۱۲۰ پرسشنامه در چهار شهر منطقه مورد مطالعه که نحوه پراکنش آن در جدول ۱ نشان داده شده است) جمع‌آوری گردید. تعداد پرسشنامه در شهرستان‌های نظرآباد و هشتگرد به دلیل وجود بهره بردار بیشتر، بالاتر در نظر گرفته شد.

حدود ۸۰ درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی متعلق به چهار محصول شامل گندم (*Triticum aestivum* L.) و جو (*Hordeum vulgare* L.) (۵۱ درصد)، ذرت علوفه‌ای (*Zea mays* L.) (۲۳/۵ درصد) و یونجه (*Medicago sativa* L.) (۵/۲ درصد) می‌باشد و بیش از ۵۰ درصد سطح زیر کشت محصولات باغی متعلق به سه محصول هلو (*Prunus Persica* L.)، شلیل (*Prunus Persica* L.) و آلو (*Persica* L.) می‌باشد (Alborz Province Agricultural Organization, 2013).

جدول ۱- پراکنش پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده

Table 1- Distribution of the collected questionnaire

شهرستان Region	چهارباغ Charbagh	تنکمان Tankaman	هشتگرد Hashtgerd	نظرآباد Nazarabad
تعداد Number	20	20	40	40

مأخذ: یافته‌های مطالعه

Source: Study Findings

کاربردی (IUPAC) و کتابچه راهنمای آفت‌کش (The Pesticide Manual, 1997) و کتاب حفاظت از محصول (Crop Protection, 2003) استخراج گردید.

اطلاعات مربوط به نوع و مقدار سموم مصرفی و روش سم‌پاشی از کشاورزان و اطلاعات ضرایب مربوط به شاخص تأثیر زیستی هر سم از پایگاه‌های اطلاعاتی اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و

جدول ۲- مشخصات سموم پر مصرف منطقه هشتگرد
Table 2- Specifications of high consumption toxins in Hashtgerd region

ردیف Row	نام عمومی Common Name	نام تجاری Trade Name	آفات Pests	محصولات Application	ویژگی‌ها Features
1	ایمیداکلوپراید Imidacloprid	کنفیدور Confidor	مینوز مرکبات، شته جالیز و مگس‌ها Citrus leafminer, aphids, flies	مرکبات، پسته و پنبه Citrus, pistachio and cotton	سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Systemic with contact and digestive effect
2	دلتامترین Deltametrin	دسیس Decis	سن گندم، مینوز، پرودنیا Sun Pest, leafminer	محصولات زراعی و باغی Crops and garden	گوارشی، تماسی و غیر سیستمیک Digestive, contact, Non- systemic
3	مالاتیون Malathion	مالاتیون Malathion	شته‌کش و کنه‌کش Aphid insecticides and acaricide	درختان میوه سردسیری، جالیز و سبزی، محصولات زراعی Cold fruit trees, kitchen garden and vegetable crops	گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک Digestive, contact, Non- systemic
4	دبازینون Diazinon	بازودین Bazodin	آفات مکند، جونده و کنه‌ها Sucking pests, rodents and ticks	محصولات زراعی و باغی Crops and garden	گوارشی، تماسی، تنفسی و غیر سیستمیک Digestive, contact, respiratory and Non-systemic
5	فوزالون Phosalon	زولون Zolon	سرخرطومی یونجه، کرم و پسیل درختان میوه Alfalfa weevils, caterpillars and fruit trees psylla	محصولات زراعی و باغی Crops and garden	فسفره تماسی و گوارشی P-contact and digestion

محاسبه شاخص^۱ (EIQ)

اجزای توصیف کننده شاخص تأثیر زیستی در معادله ۱ بیان گردیده است و برای محاسبه آن از ۱۱ متغیر استفاده می شود. مقدار عددی EIQ میانگین سه جزء اصلی شامل آسیب بالقوه برای سلامت کارگران مزرعه، آسیب بالقوه برای مصرف‌کنندگان از طریق اثر مستقیم مواد سمی باقیمانده در محصولات غذایی و یا از طریق آلودگی آب‌های زیر زمینی و اثرات منفی بالقوه برای محیط‌زیست شامل موجودات زنده آبزی و خشکی‌زی را نشان می‌دهد. جزئیات محاسبه هریک از این سه بخش توسط (Kovach et al., 1992) ارائه گردیده است که در معادله ۱ آورده شده است. تمامی داده‌های ورودی چه داده‌های عددی (۶ متغیر) و چه داده‌های قیاسی (۵ متغیر) که به صورت تأثیر کم، متوسط و زیاد قضاوت می‌گردند به نسبت زیان

بار بودن، نمره یک، سه یا پنج را به خود اختصاص می‌دهند. نمره ۱ هنگامی که آفت‌کش دارای سمیت پایینی است و یا این که تأثیر کمی بر آن متغیر دارد (برای مثال، دوره کوتاه تماس با سم)، نمره ۳ هنگامی که دارای سمیت و یا تأثیر متوسط است و نمره ۵ هنگامی که آفت‌کش دارای سمیت بالایی است و یا تأثیر منفی زیادی بر محیط زیست دارد، تعلق می‌گیرد (Kovach et al., 1992; Sande et al., 2011). معادله ۱ روش محاسبه شاخص EIQ را نشان می‌دهد.

$$EIQ = \{ [C \{ (DT \times 5) + (DT \times P) \}] + [C \times ((S + P) \div 2) \times SY] + (L) \} + (F \times R) + (D \times ((S + P) \div 2) \times 3) + (Z \times P \times 3) + (B \times P \times 5) \} \div 3$$

معادله (۱)

در این معادله DT: سمیت پوستی، C: سمیت مزمن S: نیمه عمر در خاک P: نیمه عمر در سطح گیاه، L: پتانسیل آبخوئی، SY: سیستمیک بودن، R: پتانسیل روان آب، F: سمیت برای ماهی‌ها، Z: سمیت برای زنبور عسل، D: سمیت برای پرندگان و B: سمیت برای

1- Environmental Impact Quotient

در این معادله، EIQFUR: شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای در واحد هکتار می‌باشد. EIQ: شاخص تأثیر زیست‌محیطی، RA: میزان مصرف حشره‌کش در واحد هکتار مزرعه و ai: میزان ماده مؤثره حشره‌کش می‌باشد.

نتایج و بحث

اطلاعات مربوط به میزان مصرف آفت‌کش‌ها و نوع آن در جدول ۳ آمده است. بیشترین مصرف سم مربوط به کلم (*Brassica oleracea* L.)، کاهو (*Lactuca sativa* L.) و لوبیا سبز (*Phaseolus vulgaris* L.) با مصرف ۱۵ لیتر در هکتار انواع سموم دفع آفات بوده است.

بندپایان سودمند است. برای هر کدام از آفت‌کش‌ها نمره‌ای ترکیبی با استفاده از معادله جبری ۱ محاسبه می‌شود و به این ترتیب عددی که به هر کدام از این متغیرها نسبت داده می‌شود با هم ترکیب شده و حاصل آن یک عدد نهایی است. مقدار ضریب EIQ که بدین روش محاسبه می‌شود، سمیت بالقوه یک آفت‌کش را نشان می‌دهد. با توجه به این نکته که ممکن است درصد ماده مؤثره یک آفت‌کش، در مصرف آن (کیلوگرم در هکتار) و تعداد دفعات سمپاشی برای هر فرمولاسیون متفاوت باشد، به همین دلیل پس از محاسبه شاخص تأثیر زیستی، از معادله ۲ میزان EIQ هر آفت‌کش در سطح مزرعه محاسبه می‌شود (Levitan, 1997).

$$EIQ_{\text{Field Use Rating}} = EIQ \times RA_{\text{per hectare}} \times ai_{\text{Insecticide}} \quad \text{معادله (۲)}$$

جدول ۳- مصرف انواع سموم حشره‌کش در هر هکتار از محصولات زراعی و باغی

Tabale 3- Usage rates of insecticide per hectare of crops and garden

نام محصول Plant name	نوع سم مصرفی The type of poison consumed	میزان مصرف آفت‌کش در هکتار (لیتر) Pesticide use per hectare (L)
گندم Wheat	دلتامترین، دیازینون Deltametrin	4
جو Barley	دلتامترین، دیازینون Deltametrin	3
ذرت علوفه‌ای Forage maize	دیازینون، فوزالون Diazinon	3
یونجه Alfalfa	فوزالون، مالاتیون Phosalon	۴/۵
کلزا Canola	دیازینون، ایمیداکلوپراید Diazinon, Imidacloprid	6
لوبیا سبز Green bean	دیازینون، دلتامترین Diazinon, Deltametrin	15
خیار Cucumber	دیازینون، دلتامترین Diazinon, Deltametrin	12
گوجه فرنگی Tomato	فوزالون Phosalon	10
کلم و کاهو Cabbage and lettuce	مالاتیون، ایمیداکلوپراید Malation, Imidacloprid	15
هلو و شلیل Peach and nectarin	دلتامترین، فوزالون، دیازینون Deltametrin, Phosalon	13
انگور Grapes	دیازینون، مالاتیون Diazinon, Malation	6
	فوزالون، مالاتیون، دیازینون Phosalon, Malation, Diazinon	12

بیشترین سمیت بالقوه زیست‌محیطی می‌باشد و پس از آن به ترتیب دلتامترین، مالاتیون، دیازینون و فوزالون در رتبه‌های بعد قرار داشتند

از میان حشره‌کش‌های عمده مصرفی در منطقه هشتگرد، ایمیداکلوپراید (کنفیدور) با شاخص تأثیر زیست‌محیطی ۱۰۵/۷ دارای

کار می‌رود، به دلیل اثر زیاد بر کارگران مزرعه و خطر تخریب اکولوژیک توصیه نمی‌شود و بهتر است حشره‌کش دیگری جایگزین آن شود. دلتامترین (دسیس) به دلیل خاصیت کشندگی قوی برای حشرات مفید نیز مشکل ایجاد می‌کند و می‌تواند آفاتی مانند شپشک‌ها، کنه‌ها و پروانه‌ها را طغیانی نماید. بخش مصرف‌کننده نسبت به دو بخش دیگر در همه سموم مصرفی، کمتر مخاطره‌آمیز بوده است. حشره‌کش دیازینون که پرمصرف‌ترین حشره‌کش مورد استفاده در منطقه بوده از نظر شاخص تأثیر زیست‌محیطی نسبت به سایر حشره‌کش‌های مورد استفاده مناسب به نظر می‌آید. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر با معرفی سموم بیولوژیکی مثل BT، بیشتر کشاورزان در کشت صیفی و سبزی از این آفت‌کش استفاده می‌کنند. در همین زمینه تحقیقی درآلمان انجام شده که شاخص EIQ مربوط به دو آفت‌کش HT & BT را با روش معمول منطقه در زراعت ذرت (*Zea mays L.*) مقایسه کرده و نتایج نشان داد استفاده از این دو محصول بیولوژیک تأثیر زیست‌محیطی کمتری، نسبت به روش رایج منطقه داشته است (Nillesen et al., 2006). کمترین خطر در جزء مصرف‌کننده و اکولوژی متعلق به حشره‌کش فوزالون (به ترتیب ۱/۷۵ و ۵۸/۲۵) و در جزء کارگران مزرعه متعلق به حشره‌کش دیازینون (۱۷/۴۷) بوده است.

(جدول ۴). همانطور که در جدول ۴ قابل مشاهده است، شاخص EIQ برای سموم ایمیداکلوپراید، دیازینون، مالاتیون و فوزالون بیشترین تأثیرپذیری را از بخش اثر اکولوژیک گرفته که به ترتیب ۱۶۹/۷۵، ۸۱/۷۵، ۶۳/۲۵ و ۵۸/۲۵ بوده است. در خصوص این سموم می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که در اراضی که آفت‌کش‌های مذکور مورد استفاده می‌باشند، موجودات زنده اکوسیستم با شدت بیشتری در معرض خطر قرار می‌گیرند. در یک مطالعه که مخاطرات زیست‌محیطی تولید پنبه (*Gossypium herbaceum L.*) در ترکیه مورد بررسی قرار گرفته بود، نقش اثرات اکولوژیک سموم مصرفی در شاخص تأثیر زیست‌محیطی از بخش‌های کارگران مزرعه و مصرف‌کننده بیشتر بود (Turgut & Erdgan, 2005). در بررسی سموم آفت‌کش ثبت شده در ایالات متحده آمریکا نیز سمیت بخش کارگران مزرعه، مصرف‌کننده و اکولوژیک به ترتیب ۳۷، ۸ و ۸۴/۴ به دست آمد و میانگین نهایی EIQ برای سموم حشره‌کش ثبت شده برابر ۴۳/۱ بود (Kovach et al., 1992).

در خصوص سم دلتامترین قسمت کارگران مزرعه بیشترین تأثیر را بر روی نمره نهایی EIQ داشته است. بالابودن تأثیر کارگران مزرعه با عدم رعایت اصول ایمنی در هنگام سم‌پاشی بالاتر می‌رود. استفاده از حشره‌کش دلتامترین که بیشتر جهت کنترل سن گندم به

جدول ۴- شاخص تأثیر زیست‌محیطی و اجزای مختلف آن برای حشره‌کش‌های پر مصرف منطقه هشترگرد

Table 4- Environmental impact quotient (EIQ) and its component for major insecticide in Hashtgerd area

نام سم Common name	شاخص تأثیر محیطی EIQ	اکولوژی Ecology	موجودات سودمند Benefit organisms	زنبور Bee	پرنده‌گان Birds	ماهی‌ها Fishes	آبشویی+ مصرف‌کننده Consumer+ leaching	آبشویی Leaching	مصرف‌کننده Consumer effects	کارگران مزرعه Farm workers	برداشت کننده Picker effects	کارگر سمپاش Applicator effects
ایمیداکلوپراید Imidacloprid	105.7	169.75	75	37.5	56.25	1	34.75	1	33.75	112.5	37.5	75
دلتامترین Deltametrin	51.7	62.75	15	37.5	5.25	5	5.077	1	4.077	87.37	19.125	58.25
مالاتیون Malathion	37	63.25	15	37.5	15.75	5	6.25	1	5.25	22.5	7.5	15
دیازینون Diazinon	34.8	81.75	15	37.5	26.25	3	5.077	1	4.077	17.47	5.825	11.65
فوزالون Phosalon	32.8	58.25	15	22.5	15.75	5	2.75	1	1.75	37.5	12.5	12

برآورد صحیحی از مقایسه دو آفت‌کشی با هم اختلاف فاحش از نظر سمیت دارند و دارای الگوی مصرف متفاوتی باشند را نشان ندهد. در عین حال از آن‌جا که متغیرهای این شاخص به‌ویژه پتانسیل آبشویی دارای وزن ثابتی هستند، استفاده گسترده از این شاخص جهت مقایسه

با وجود کارایی بالای شاخص تأثیر زیست‌محیطی در ارزیابی سمیت بالقوه سموم آفت‌کش، ایراداتی نیز به این شاخص وارد است. یکی از این ایرادات این است که چون دامنه نمره‌دهی برای هر آفت‌کش در این شاخص پایین تر است (۱، ۳ و ۵)، ممکن است

مناطق زراعی مختلف با اقلیم‌های متفاوت (پتانسیل آبخویی در مناطق مختلف بر مبنای میزان بارندگی آن‌ها متفاوت می‌باشد) احتمال بروز خطا را افزایش می‌دهد. با وجود معایبی که این شاخص دارد در مناطقی که اطلاعات کمی در خصوص خاک و میزان نفوذ وجود ندارد، بسیار مناسب و کارا می‌باشند (Moeinodini et al., 2014).

شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه

نتایجی که تاکنون بیان شد، سمیت بالقوه سموم را نشان داد، لیکن برای تعیین میزان سمیت بالفعل و واقعی، میزان سم مصرف شده و ماده مؤثره در فرمولاسیون سم نیز لازم است. بر این اساس شاخص دیگری به نام ضریب اثر محیطی مزرعه ای برای آفت‌کش‌ها مطرح می‌گردد. با توجه به جدول ۵ مشاهده می‌گردد، حشره‌کش مالاتیون در منطقه هشتگرد با شاخص تأثیر محیطی مزرعه‌ای ۴۲/۱۸ به عنوان پرخطرترین سم برای محیط‌زیست شناخته شده است و پس از آن حشره‌کش پرمصرف دیازینون که بیشترین مصرف را از نظر فراوانی استفاده داشت، با شاخص تأثیر محیطی مزرعه‌ای ۴۱/۷۶ در

رتبه بعد قرار گرفت. با وجود آن که سم کنفیودر نسبت به دیگر سموم مصرفی دارای شاخص تأثیر زیست‌محیطی بالاتری بود یعنی سمیت بالقوه بیشتری داشت، ولی به دلیل ماده مؤثره و دز مصرفی پایین، از نظر شاخص تأثیر محیطی مزرعه‌ای در رتبه سوم قرار گرفت. بنابراین، تأثیر سم بر محیط‌زیست و موجوات زنده با توجه به نوع سم مصرفی و میزان مصرف آن متفاوت می‌باشد. در یک مطالعه اثرات زیست‌محیطی کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌ها در مزارع برنج کلات نادر مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن بود که قارچ‌کش کاربندازیم با شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای برابر ۵۴/۱ و در بین حشره‌کش‌ها دیازینون با شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای ۵۸/۹ بیشترین خطرآفرینی را دارا بوده است. در این مطالعه شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای مالاتیون ۲۳/۲ ثبت گردید (Agah., 2015). در یک پژوهش برای ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی تولید سیب طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ در ایتالیا از شاخص تأثیر زیست‌محیطی استفاده گردید. نتایج این پژوهش کاهش اثرات محیطی استفاده از آفت‌کش‌ها را با استفاده بیشتر از آفت‌کش‌های انتخابی و مدیریت تلفیقی آفات اثبات کرد (Iorriatti et al., 2011).

جدول ۵- شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه سموم حشره‌کش عمده مصرفی در منطقه هشتگرد
Table 5- The farm Environmental Impact Quotient of major insecticide in Hashtgerd area

نام سم Common name	شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه (EIQ) درهکتار) The farm Environmental impact quotient	شاخص تأثیر زیستی (Environmental impact) quotient	مقدار ماده مؤثره (%) The amount of active ingredient (%)	دز مصرفی (لیتر) Dosage (L)
دلتامترین Deltamethrin	64	51.7	2.5	0.5
دیازینون Diazinon	41.76	34.8	60	2
فوزالون Phosalone	22.96	32.8	35	2
مالاتیون Malathion	42.18	37	57	2
ایمیداکلورپراید Imidacloprid	27.7	105.7	35	0.75

زیست‌محیطی آفت‌کش‌های مصرفی در گندم و جو در مشهد را مورد بررسی قرار دادند، تطابق داشت و بنابراین برای کنترل سن گندم استفاده از دلتامترین با توجه به شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه،

حشره‌کش دلتامترین به دلیل دز مصرفی پایین و ماده مؤثره کمتر، مقدار بسیار ناچیزی از شاخص EIQFUR را به خود اختصاص داد که با نتایج مالکی و همکاران (Maleki et al., 2015) که تأثیر

اکولوژیک مربوط به سم کنفیدور بود که این سم را به‌عنوان خطرناک‌ترین حشره‌کش پرمصرف منطقه هشتگرد مطرح کرده است. در خصوص سمومی مثل کنفیدور و دلتامترین که اثر جزء کارگران مزرعه بر نمره نهایی EIQ بالا بود، رعایت اصول ایمنی سم‌پاشی اثرات این جزء را به مراتب کاهش خواهد داد. حشره‌کش فوزالون به دلیل کسب شاخص زیست‌محیطی پایین‌تر به عنوان کم‌خطرترین حشره‌کش پرمصرف منطقه از نظر سمیت بالقوه تعیین شد. با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی جهت استفاده سموم و آگاه‌سازی کشاورزان از مخاطرات مصرف و توجه به استفاده از آفت‌کش‌های کم‌خطرتر و سیاست‌گذاری در جهت انتخاب آفت‌کش‌های کم‌آسیب پیشنهاد می‌شود این شاخص در خصوص کلیه آفت‌کش‌های مورد استفاده در منطقه محاسبه گردد، و انتخاب سموم در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات با توجه به این شاخص صورت پذیرد.

مناسب‌تر از دیازینون به نظر می‌رسد. شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای برای هر حشره‌کش قابل محاسبه است و با توجه به این که برای هر گیاه سموم حشره‌کش متفاوت و متعددی استفاده می‌شود یعنی برای کنترل آفات یک گیاه ممکن است از چند حشره‌کش استفاده شود، بنابراین، شاخص تأثیر زیست‌محیطی مزرعه‌ای برای گیاه محاسبه نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

با گسترش روش‌های زیست‌بوم محور در راستای مدیریت آفات و استفاده از روش‌های تلفیقی کنترل آفات، می‌توان مخاطرات زیست-محیطی ناشی از استفاده حشره‌کش‌ها را تا حد زیادی کاهش داد. در میان حشره‌کش‌های عمده مصرفی در منطقه هشتگرد سمیت بالقوه ایمداکلوپراید (کنفیدور) و تأثیر محیطی مزرعه‌ای مالاتیون بیشتر بود. بیشترین خطر در هر سه جزء کارگران مزرعه، مصرف‌کننده و

منابع

- Bay Bordi, M. 2000. Production and consumption of chemical fertilizer in line with the objectives of sustainable Agriculture. Published Agricultural Education, Karaj p. 33-34. (In Persian)
- Bues, R., Bussieres, P., Dadomo, Y., Garcia-Pomar, M.I., and Lyannaz, J.P. 2004. Assessing the environmental impact of pesticides used on processing tomato crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 102(2): 155-162.
- Deihimfard, R., Zand, E., Damghani, A.M., and Soufizadeh, S. 2007. Herbicide risk assessment during the wheat self-sufficiency project in Iran. *Pest Management Science* 63(10): 1036-1045. (In Persian with English Summary)
- Holvoet, K. 2006. Monitoring and modeling the dynamic fate and behavior of pesticides in river systems at catchment scale. PhD thesis, Ghent University, Belgium 242 pp.
- Ioriatti, C., Agnello, A.M., Martini, F., and Kovachk, J. 2011. Evaluation of 330 the environmental impact of apple pest control strategies using pesticide risk indicators. *Integrated Environmental Assessment and Management* 1-8, DOI 10.1002/ieam.185
- Kim, C. 2001. Developing Policies for Agriculture and the Environment, Korea Rural Economic Institute. 4-102 Hoegi-Dong, Dondaemoon-Ku Seoul, 130-710, Korea, 2001-12-01.
- Jansen, D.M., Stoorvogel, J.J., and Schipper, R.A. 1995. Using sustainability indicators in agricultural land use analysis: an example from Costa Rica. *Netherlands Journal of Agricultural Science* 43: 61-82.
- Kovach, J., Petzoldt, C., Degni, J., and Tette, J. 1992. A method to measure the environmental impact of pesticides. *New York's Food and Life Sciences Bulletin* 139(12): 1-8.
- Levitan, L. 1997. A review of pesticide impact assessment systems. In: Workshop on Pesticide Risk Indicators, 21th-23th April, Copenhagen, Denmark.
- Malakouti, M.J., Nafisi, M., Motesharezadeh, B., Khavazi, K., Masihabadi, M., Rezaei, H.H., Shahabi, A.A., and Bazargan, K. 2001. Production and balanced use of fertilizers as a worthy step toward self-sufficient and a sustainable agriculture. *Soil and Water Journal* 12(14): 1-4. (In Persian with English Summary)
- Metcalf, R.L. 1982. Insecticides in Pest Management. In: Metcalf, R.L. and W.H. Luckman. Eds., *Introduction to Insect Pest Management*, 2nd Ed., John Wiley, NY p. 217- 277.
- Moeinodini, S., Zand, E., Kambuziya, J., Mahdavi Damghani, A.M., and Deyhimfard, R. 2014. Environmental risk assessment of registered insecticide use in Iran using EIQ. *Journal of Agroecology* 6(2): 250-265. (In Persian with English Summary)

- Sande, D., Mullen, J., Wetzstein, M., and Houston, J. 2011. Environmental impacts from pesticide use: A case study of soil fumigation in Florida tomato production. *International Journal of Environmental Research in Public Health* 8: 4649-4661.
- Soltani, A., Rajabi, M.R., Soltani, E., and Zeinali, E. 2011. Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan. Final Report, Research Vice-Presidency, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran p. 201-218. (In Persian with English Summary)
- Turgut, C., and Erdogan, O. 2005. The environmental risk of pesticide in cotton production in Aegean region, Turkey. *Journal of Applied Science* 5(8): 1391-1393.

Evaluation of Environmental Risks in the Use of Insecticide in Hashtgerd Area using EIQ

S.J. Yadollahi Nooshabadi¹, M.R. Jahansuz^{2*}, N. Majnoun Hosseini² and G.R. Peykani³

Submitted: 21-10-2015

Accepted: 18-08-2016

Yadollahi Nooshabadi, S.J., Jahansuz, M.R., Majnoun Hosseini, N., Peykani, G.R., and Sarmadian, F. 2018. Evaluation of environmental risks in the use of insecticide in Hashtgerd area using EIQ. *Journal of Agroecology* 9(4): 1020-1030.

Introduction

Recently, there is an increasing concern about the effects of pesticides on non-target organisms. Residual of pesticides cause environmental pollution and put in danger the human health. The problem is always in contact with pesticides, there are numerous risks related to the environmental and human health threat at different levels of their cycle, including production, sale, use in the field and ultimately for residue in food occurs. This study consider the harmful effects of pesticides in Hashtgerd study area and their potential and environmental risks using EIQ index. Environmental Impact Quotient (EIQ) is a model based on algebraic equations which by it can be classification chemical pesticides based on environmental hazards and risks to human health and toxins that cause minimal risk are selected. The ultimate purpose of this study was to determine 5 insecticide have been the highest consumption in the region Hashtgerd and then determine the potential environmental risks of them by EIQ index, so that eventually we can identify and eliminate hazardous insecticides.

Materials and Methods

Hashtgerd study area is one of 609 countries study area that is located in the Alborz province. This area with an extent of about 1170 km² because of the proximity to the metropolis of Tehran and focus a large number of agricultural, industrial and service units has an important economic and political position. The numerical value of the EIQ is average of the three main components include of the potential damage to the health of farm workers, the potential damage to consumers through the direct effect of toxic residues in food products or through ground water contamination and potential negative effects on the environment, including aquatic and terrestrial organisms show. The describes components of the EIQ are contains 11 variables. All input data for the impact of low, medium and high are judged to be harmful than, the one, three or five into account. Information on types of pesticides through questionnaires and interviews with farmers of all crops and gardens in the area (120 questionnaires in four cities in the study area) were collected. Information on pesticides and their effects from data bases IUPAC and the Pesticide Manual, 1997 and Crop Protection, 2003 were collected.

Results and Discussion

Because EIQ index for imidacloprid, diazinon, malathion and phosalone pesticides has been most affected by the ecological effects, It can be concluded that in the land area that these insecticides were used, biotic intensity are at highest risk. In a study that examined environmental hazards of cotton production in Turkey, the role of ecological effects of pesticides on EIQ was more than consumer parts and farm workers. In examining of the pesticides registered in the United States, toxicity of farm workers, consumers and ecological were 37, 8 and 84.4 respectively and the final average EIQ for insecticides registered was 43.1. According to this another factor considered is the farm environmental impact of pesticides. Malathion insecticide in Hashtgerd region with farm environmental impact 42.18 as the most dangerous environmental toxins known and then insecticide diazinon that had the highest consumption in frequency of use, with farm environmental impact 41.76 was next in rank.

1, 2 and 3- PhD Student in Crop Ecology, Professor, Department of Crop Ecology, Associate Professor, Department of Agricultural Economics, College Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, respectively.

(*- Corresponding author Email: jahansuz@ut.ac.ir)

DOI:10.22067/JAG.V9I4.50487

Although Imidaclopride compared to other pesticides had a higher EIQ index so the potential toxicity was more but because of active ingredient and low dosage in terms of farm environmental impact was in third place. Therefore, with the expansion of the ecosystem-based approach to manage pests and method of integrated pest management, it can be greatly reduced environmental hazards arising from the use of insecticides. Among the major insecticides used in the Hashtgerd region potential toxicity of imidaclopride and farm environmental impact of malathion was more. The highest risk in all three components of farm workers, consumers and ecological related to Imidaclopride that has raised the most dangerous insecticides name as the main consumption in the Hashtgerd region. The results showed that based on the environmental impact index, most of environmental hazards of insecticides in the Hashtgerd region are due to lack of proper knowledge and incorrect selection of some insecticides and their use is excessive. In Imidaclopride and deltamethrin that farm workers effect of them on the final score EIQ was high, safety spraying will reduce the effects of this component by far.

Conclusion

The results showed that among major consumed insecticides in the area Hashtgerd, potential toxicity of Imidacloprid and farm Environmental impact of Malathion was greater. Highest risk of all three components of farm workers, consumers and ecological, related to Imidaclopride insecticide that referred to as the most dangerous major pesticide consumption in the Hashtgerd region.

Keywords: Ecological Effect, Environmental impact quotient, Pesticides